


مراجعة کننده محترم همراه محترم :

این مطالب جهت افزایش اطلاعات شاتیه شده است در صورت حرکت سوال پرسش و نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید به صورت حضوری به بخش دیالیز با شماره تلفن های 28-66783120 داخلی 239 بخش دیالیز از ساعت 9 صبح لغایت

7 شب تماس بگیرید .

شالون: یک لوله به شکل  جهت دسترسی به عروق

اصلی برای انجام عمل دیالیز استفاده می شود به دو نوع دائم و

موقت می باشد.

تفاوت شالون دائم و موقت :

موقتی: طول عمر موقت 3 تا 5 ماه

دائمی: یکساله و گاهی بیشتر

آموزش های مراقبتی به بیمار:

1- همیشه ناحیه کاتتر خشک و تمیز نگه داری شود.

2- محل کاتتر از حرکت ضربه و کشیدگی حفظ گردد.

3- پس از بهبودی زخم، بیماری تواند از دوش استفاده کند و از

نخوردن در آب و زیاد ماندن در حمام اجتناب گردد.

4- در صورت مشاهده جابه جایی و یا باز شدن بنجیه بدون دستکاری

آن به پزشک معالج مراجعه شود.

5- در صورت بروز علایمی مثل ترشح قرمزی، درد، سفتی لوله یا

تب و لرزه به پزشک مراجعه گردد.

6- پس از هر بار دوش گرفتن محل شالون مجدداً باید پانسمان

شود. طریقه انجام پانسمان توسط پرستار مسئول بیمار در بخش دیالیز

آموزش داده خواهد شد.

8- نباید به هیچ کس اجازه خون گیری و یا تزریق دارو و یا سرم

را از طریق کاتتر بدهید



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

بیمارستان شهیدای یافت آباد

نگات مراقبتی از سالدون در منزل



کرده هف: بیمار همراه

کرده آونده: م. مرندی

فروردین 1392

منبع: پرستاری در نارسائی کلیوی. نویسندگان اداره پیوند و بیماریهای خاص. وزارت بهداشت.

1387.

9. در صورت جابجایی کاتتر به بیج عنوان آزاد ستکاری نکند.

10- از بیج خوردگی و تا خوردگی جلوگیری کنند.

11. هنگام خوابیدن به طریقی که سالدون گذاشته شده است، نخوابند