

ابتلا بیش از ۱۰ درصد بزرگسالان به وزوز گوش

دبیر علمی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران گفت: شیوع بیماری وزوز گوش بطور متوسط در جمعیت بزرگسال ۱۰ درصد است که ۲ درصد آنها وزوز شدید دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، دکتر فرنوش جاراللهی گفت: طبق آمارهای خارجی شیوع وزوز گوش بطور متوسط در جمعیت بزرگسالان ۱۰ درصد است که ۲ درصد آنها وزوز شدید دارند.

وی گفت: بیش از ۷۰ درصد افراد بزرگسال مبتلا به وزوز گوش مشکلات بارز شنوایی دارند و حتی وزوز گوش در کودکانی که دارای کاهش شنوایی هستند بین ۳۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده است.

وی با بیان اینکه به رغم شیوع بالای وزوز در کشورمان هنوز آمار دقیقی از این عارضه نداریم افزود: وزوز یک اختلال عملکردی است و از دیدگاه علم پزشکی با وجودی که وزوز یک اختلال خوش خیم تلقی می شود، درعین حال می تواند اضطراب، آشفتگی، پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریک پذیری، بی خوابی، ترس و انزوا را در فرد مبتلا ایجاد کرده و کیفیت زندگی او را در کار، فعالیت های روزمره، تفریح و تعاملات اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد.

دبیر علمی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران گفت: امروزه روش هایی برای وزوز گوش های غیرقابل درمان پزشکی مطرح هستند که تحت عنوان کلی «تدابیر درمان توانبخشی» مطرح می شود و شامل روش های متعددی از جمله روش های درمان شناختی، تحریک الکتریکی، استفاده از سمک و یا کاشت حلزون در مواقعی که وزوز، توأم با کاهش شنوایی است و در بین روش ها صوت درمانی بویژه روش TRT یکی از روش های مؤثر و شناخته شده ای است که برای رهایی از اثرات ناخوشایند وزوز در افراد مبتلا به وزوز گوش مزمن، مطرح است و یک روش درمان بین المللی برای وزوز گوش است.

دکتر جاراللهی افزود: شیوع بالای بیماری وزوز گوش موجب شد تا یک روز از پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی را به این مبحث اختصاص دهیم. پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران با تلاش انجمن علمی شنوایی شناسی و دانشگاه علوم پزشکی ایران و با حمایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مؤسسات تحقیقاتی و سازمان های مرتبط برگزار می شود. پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی از ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت امسال در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.