

پاره شدن زودرس کیسه آب جنین

یکی از مشکلاتی که بعضی از خانم های باردار تجربه می کنند پاره شدن زودرس کیسه آب است . شاید تصور کنید این مشکلات فقط در ماه آخر حاملگی اتفاق می افتد اما این تصور اشتباه است . پارگی کیسه آب ممکن است در هر زمانی رخ دهد این اتفاق گاهی با دفع ترشح روشن یا نشت مقدار کمی ادرار اشتباه گرفته میشود.

کیسه آب چیست و چرا وجودش اهمیت دارد؟

در اولین هفته ای که جنین داخل رحم تشکیل می شود ، کیسه ای به دور او شکل میگیرد که درون این کیسه مقداری آب وجود دارد . این مایع که برای ادامه حیات جنین لازم و حیاتی است به نام مایع آمنیوتیک معروف است . جنین تقریباً در داخل این مایع شناور است و این مایع نقش مهمی در سلامت او دارد . اگر جنین تحت فشار قرار بگیرد و میزان مایعات کاهش پیدا کند ، ممکن است دچار عارضه ها و اختلال های جدی شود و حتی گاهی اوقات ، این مساله به از دست رفتن یک عضو یا مرگ وی منجر میشود .

وظایف این کیسه چیست ؟

وجود مایع در کیسه آمنیوتیک و در اطراف جنین ، هم جلو آسیب ها و حوادث را میگیرد و هم در حقیقت بستری است که جنین به وسیله آن میتواند به زندگی طبیعی خود ادامه دهد و در صورت کاهش مایع درون

آن خطرهای زیادی او را تهدید میکند .



چرا کیسه آب پاره می شود؟

علت اصلی پارگی کیسه آب در دوسوم موارد نامشخص است اما یکی از دلایلی که مشخص وشایعند، عفونت ها هستند .

عفونتی که بتواند وارد خون شود ، میتواند برای جنین خطرناک باشد ، چرا که با افزایش درجه حرارت مادر این مساله می تواند زمینه ساز پارگی کیسه آب شود . عفونت حتی موضعی هم میتواند سبب پارگی زودرس شود چنین عفونتی اگر در قسمت دستگاه تناسلی ایجاد شود ، ممکن است به طرف رحم حرکت کرده و سبب آزاد شدن مواد التهابی (پروستاگلاندین ها) و پاره شدن کیسه آب شود از عوامل دیگر میتوان به تروما (ضربه)، حوادث، تصادفات و زمین خوردن شدید

اشاره کرد که می تواند باعث پارگی کیسه آب شود . ناهنجاری های رحمی مانند رحم تک شاخ ، دو شاخ یا انواع دیگر ، نارسایی هایی که در دهانه رحم وجود دارد و طول کوتاه دهانه رحم و باز شدن ناگهانی دهانه رحم نیز می توانند به پاره شدن کیسه آب منجر شود . اندازه طول دهانه رحم اگر کمتر از حد عادی باشد ، میتواند زمینه ساز پارگی زودرس کیسه آب شود. اختلال های وضعیت قرارگیری جنین در رحم و همچنین برخی از بیماریها از جمله بیماریهای مادر نظیر فشار خون و دیابت که با افزایش میزان مایع آمنیوتیک همراه است میتواند باعث پارگی زودرس کیسه آب شود . به طور کلی میتوان گفت هر علتی که باعث اتساع بیش از حد رحم شود و حجم مایع را افزایش دهد ، میتواند به پارگی زودرس کیسه آب منجر شود چند قلوبی، سابقه پارگی کیسه آب در بارداریهای قبلی و جراحی های قبلی دهانه رحم نیز میتواند در این امر دخیل باشند .

آیا می توان مانع از پارگی کیسه آب شد ؟

گاهی اوقات نمی توان جلوی برخی مشکلات را گرفت اما در مواردی که مشکلات دهانه رحمی وجود دارد ، می توان با دو ختن دهانه رحم و برخی اقدامهای دیگر ، مانع از پارگی زودرس کیسه آب شد. خوشبختانه اکثر پارگی های کیسه آب در اواخر بارداری اتفاق می افتد ولی در هر شرایطی ممکن است ایجاد شود. این مشکل در ماههای پایین بارداری کمتر اتفاق می افتد.

مرکز آموزشی و درمانی

شهید اکبر آبادی

پاره شدن زودرس

کیسه آب جنین



که پارگی اندک است، گاهی حتی دیده شده که استراحت مادر میتواند سبب تشکیل مجدد مایع آمنیوتیک شود.

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما
۱۳۹۲



بعد از پارگی کیسه آب چه اقدامی باید انجام شود؟

از آنجایی که جنین می تواند از هفته ۲۶ تا ۲۸ هفتگی به بعد زنده بماند و قبل از آن معمولاً بچه قادر به زنده ماندن نیست، اگر پارگی قبل از هفته ۲۶ باشد، متأسفانه عوارض بیشتری سلامت مادر و جنین را تهدید می کند، چرا که نمی توان بچه را نگه داشت و مادر باید بستری شود و تحت نظر قرار بگیرد. در هفته های بالاتر، حدود ۳۴ تا ۳۶ هفتگی، اگر پارگی کیسه آب واضح نباشد، مادر باید تحت نظر باشد و روزانه آزمایش های لازم انجام شود و از نظر بروز تب هم کنترل شود.

همچنین ضربان قلب جنین و علائم حیاتی او چک می شود تا دچار مشکل خاصی نشود. معمولاً آنتی بیوتیک هم با نظر پزشک برایش تجویز می شود. اگر پارگی کیسه آب واضح و زیاد باشد، نگه داشتن بچه صلاح نیست، چرا که ممکن است روی بند ناف فشار وارد شده و این موجب اختلال در جریان خون بچه شود. در این شرایط باید به بارداری خاتمه داد. در مواردی