



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مجموعه مدد ایران

معاونت بالینی داروسازی

راهنمای داروهای خود به خود متوقف شونده Automatic Stop Orders



تهیه کننده: دکتر فاخته واحدی

بهار ۱۳۹۴

به نام خدا

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که بعلت اثرات و عوارض خاصی ، پس از گذشت مدت زمان معینی ، مصرفشان نباید ادامه یابد و جهت ادامه تجویز باید از پزشک معالج دستور مجدد گرفته شود. هدف از این تعریف این کار در سیستم HIS بیمارستان ارزیابی دوره ای داروهای خاص و اطلاع آن به پزشک و گرفتن دستور جدید برای ادامه مصرف می باشد. از این طریق تیم درمان از تجویز ایمن داروهای بیمار اطمینان حاصل می نماید.

فهرست داروها و زمان ارزیابی

| نام دارو | فواصل ارزیابی مجدد |
|---|--------------------|
| آنتی بیوتیک ها (تزریقی و خوراکی) بجز داروهای ضد سل و ایدز | ۴ روز |
| آنتی بیوتیک های موضعی | ۱۰ روز |
| ضد قارچ های موضعی | ۳۰ روز |
| داروهای مخدر تزریقی | ۴۸ ساعت |
| پچ فنتانیل | ۳ روز |
| محلول های استنشاقی به وسیله نبولایزر | ۷ روز |
| فراورده های چشمی (بجز در موارد گلوکوم و لوبریکانت ها) | ۷ روز |
| تنگ کننده های عروق (چشمی و بینی) | ۳ روز |
| هپارین و انوکسپارین | ۷ روز |
| وارفارین | ۱۴ روز |
| NSAIDs | ۱۰ روز |
| کتورولاک تزریقی | ۵ روز |
| کورتيكوستيروئیدها (چشمی و خوراکی) | ۱۰ روز |
| استروئیدهای آنابولیک | ۱۰ روز |
| داروهای اعصاب و روان | ۱۴ روز |
| مولتی ویتامین ها، منیزیم هیدروکساید، استامینوفن | ۳۰ روز |
| اندانسترون | ۲۴-۴۸ ساعت |